



**CULTIVARES DE CAFÉ DESENVOLVIDAS PELO
INSTITUTO AGRÔNOMO (IAC) E REGISTRADAS NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO – MAPA
(REGISTRO NACIONAL DE CULTIVARES - RNC)**



CULTIVAR		CARACTERÍSTICAS
Bourbon Vermelho	IAC 662	Porte alto; frutos vermelhos e de maturação precoce (20-30 dias antes da cultivar Mundo Novo IAC 376-4); sementes com peneira média 16; altamente suscetível à ferrugem. Excelente qualidade de bebida. Indicada para plantios principalmente em regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000 m) e/ou para cafeicultores que estão buscando nichos de mercado visando cafés especiais. Apresenta vigor e produtividade menores do que a cultivar Mundo Novo IAC 376-4.
Bourbon Amarelo	IAC J2; IAC J9; IAC J10; IAC J19; IAC J20; IAC J22; IAC J24	Porte alto; frutos amarelos e de maturação precoce (20-30 dias antes da cultivar Mundo Novo IAC 376-4), sementes com peneira média 16; altamente suscetível à ferrugem. Excelente qualidade de bebida. Indicada para plantios principalmente em regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000m) e/ou para cafeicultores que estão buscando nichos de mercado visando cafés especiais. Apresenta vigor e produtividade menores do que a cultivar Mundo Novo IAC 376-4.
Mundo Novo	IAC 379-19; IAC 376-4; IAC 382-14; IAC 388-6; IAC 388-17; IAC 388-17-1; IAC 464-12; IAC 515-20; IAC 501-5; IAC 502-1; IAC 467-11; IAC 480-6; IAC 515-11	Porte alto; vigorosa; frutos vermelhos e de maturação média; sementes com peneira média entre 16 e 17; suscetível à ferrugem. As cultivares Mundo Novo IAC 388-6, IAC 388-17, IAC 388-17-1 apresentam ramos laterais mais longos (maior diâmetro da copa). Ótima qualidade de bebida. A sua formação é de 50% de 'Bourbon' e 50% de 'Típica'. É uma das cultivares mais plantadas no Brasil, principalmente Mundo Novo IAC 379-19 e IAC 376-4, que são excelentes para a colheita mecânica e safra zero.
Acaiaí	IAC 474-1; IAC 474-4; IAC 474-6; IAC 474-7; IAC 474-19; IAC 474-20	Porte alto; copa cilíndrica com diâmetro menor do que o da cultivar Mundo Novo IAC 376-4, frutos vermelhos e de maturação mais uniforme e média para precoce, com peneira média entre 17 e 18; suscetível à ferrugem. Possui ótima qualidade de bebida. A sua formação é de 50% 'Bourbon' e 50% de 'Típica'. Excelente cultivar para a colheita mecânica.
Icatu Vermelho	IAC 2941; IAC 2942; IAC 2945; IAC 4040; IAC 4041; IAC 4042; IAC 4043; IAC 4045; IAC 4046; IAC 4228	Porte alto; copa com diâmetro maior do que o da cultivar Acaiaí IAC 474-19; vigorosa; frutos vermelhos de maturação média a tardia; sementes com peneira média entre 16 e 17; moderadamente suscetível à ferrugem. Excelente qualidade de bebida para café espresso. Tem se mostrado mais sensível à seca do que as cultivares tradicionalmente cultivadas. Ótima para safra zero e cultivo irrigado.
Icatu Amarelo	IAC 2944; IAC 3686; IAC 2907	Porte alto; copa com maior diâmetro que a cultivar Acaiaí IAC 474-19; vigorosa; frutos amarelos de maturação média a tardia; sementes com peneira média entre 16 e 17; moderadamente suscetível à ferrugem. Apresenta excelente qualidade de bebida para café espresso. Tem se mostrado mais sensível à seca do que as cultivares tradicionalmente cultivadas. Ótima para safra zero e cultivo irrigado.
Icatu Precoce	IAC 3282	Porte alto; frutos amarelos de maturação precoce; sementes com peneira média 16; moderadamente suscetível à ferrugem. Indicada para plantios em regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000 m). Excelente qualidade de bebida para café espresso. Tem se mostrado mais sensível à seca do que as cultivares tradicionalmente cultivadas.
Caturra Vermelho	IAC 477	Porte baixo; diâmetro da copa menor do que o da cultivar Catuaí Vermelho IAC 99; frutos vermelhos; maturação precoce; peneira média 16. É indicada também para regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000 m) e para a produção de cafés especiais. Exigente em nutrição e indicada para plantios adensados. Ótima qualidade de bebida ('Bourbon Vermelho' de porte baixo). Suscetível à ferrugem.
Caturra Amarelo	IAC 476	Porte baixo; diâmetro da copa menor do que o da cultivar Catuaí Amarelo IAC 62; frutos amarelos; maturação precoce; peneira média 16. Apresenta ótima qualidade de bebida ('Bourbon Amarelo' de porte baixo). É suscetível à ferrugem. É indicada também para regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000 m) e para produção de cafés especiais. Exigente em nutrição e é indicada para plantios adensados.
Catuaí Vermelho	IAC 15; IAC 24; IAC 44; IAC 51; IAC 72; IAC 81; IAC 99; IAC 144	Porte baixo; internódios curtos; ramificação secundária abundante; frutos vermelhos de maturação média a tardia; sementes de tamanho médio; peneira média 16; suscetível à ferrugem Apresenta ótima qualidade de bebida. Indicada também para plantios adensados. É uma das cultivares mais plantadas no Brasil. A participação do café Bourbon em sua formação é de 75%.
Catuaí Amarelo	IAC 17; IAC 32; IAC 39; IAC 47; IAC 62; IAC 74; IAC 86; IAC 100	Porte baixo; internódios curtos; ramificação secundária abundante; frutos amarelos, de maturação média a tardia; sementes de tamanho médio; peneira média 16; suscetível à ferrugem. Ótima qualidade de bebida. Indicada também para plantios adensados. É uma das cultivares mais plantadas no Brasil. A participação do café Bourbon em sua formação é de 75%.
Obatã	IAC 1669-20	Porte baixo; vigorosa; internódios curtos; boa ramificação secundária; brotos novos de coloração verde; frutos grandes, vermelhos e de maturação média a tardia; sementes com peneira média 17; moderadamente resistente à ferrugem. Exigente em nutrição e mais sensível à seca do que a cultivar Catuaí Vermelho IAC 99. Apresenta excelente qualidade de bebida. Ótima cultivar para plantios irrigados.
Tupi	IAC 1669-33	Porte baixo; com diâmetro da copa menor do que o da cultivar Obatã IAC 1669-20, internódios curtos; brotos novos de coloração bronze; frutos grandes, vermelhos e de maturação precoce; sementes com peneira média 17; moderadamente resistente à ferrugem. Apresenta boa qualidade de bebida. É exigente em nutrição e mais sensível à seca do que a cultivar Catuaí Vermelho IAC 99. É indicada também para plantios em regiões de altitudes mais elevadas (acima de 1000 m) e seu plantio deve ser feito preferencialmente sob condições de irrigação.
IAC 125 RN		Porte baixo; internódios curtos; brotos novos de coloração verde; frutos grandes, vermelhos e de maturação precoce; sementes com peneira média 17; resistente à ferrugem e às duas raças de nematoide <i>Meloidogyne exigua</i> . Apresenta boa qualidade de bebida. É exigente em nutrição e mais sensível à seca do que a cultivar Catuaí Vermelho IAC 144. É indicada também para plantios adensados e em regiões de altitudes mais elevadas. É cultivar apropriada para irrigação.
IAC Ouro Verde		Porte baixo; internódios curtos; ramificação secundária abundante; folhas novas com coloração verde e ou bronze; frutos vermelhos de maturação média a tardia; sementes com peneira média entre 16 e 17; suscetível à ferrugem; qualidade de bebida excelente. É indicada também para plantios adensados.
IAC Obatã 4739 (Amarelo)		Porte baixo; vigorosa; internódios curtos; boa ramificação secundária; brotos novos de coloração verde; frutos grandes, amarelos e de maturação média a tardia; sementes com peneira média 17; moderadamente resistente à ferrugem. É exigente em nutrição e mais sensível à seca do que a cultivar Catuaí Amarelo IAC 62. Apresenta boa qualidade de bebida. É uma ótima cultivar em plantios irrigados.
Ibairi IAC 4761		Cultivar derivada do cruzamento da variedade mokka com a cultivar Bourbon Vermelho. Porte médio; copa ramificada e compacta; folhas novas de coloração bronze; folhas adultas pequenas; frutos vermelhos, arredondados, pequenos e de maturação precoce; sementes menores que a cultivar Bourbon Vermelho. Apresenta baixa produtividade e é suscetível à ferrugem. Em tupi-guarani a palavra Ibairi significa fruta doce e pequena. Apresenta bebida de excelente qualidade, com aroma e sabor intensos. É indicada para mercados especiais.
Laurina IAC 870		Cultivar obtida por mutação da cultivar Bourbon Vermelho. Porte pequeno com forma cônica; apresenta vários caules; ramificação densa; ramos laterais e internódios curtos; folhas pequenas e elípticas; folhas novas de coloração verde; frutos vermelhos, pequenos e de maturação precoce; sementes longas, estreitas e afiladas na base. O teor de cafeína em suas sementes é em torno de 0,6%. Apresenta baixa produtividade e é suscetível à ferrugem. A bebida é suave e de ótima qualidade. É indicada para mercados especiais de bebidas de baixo teor de cafeína.
Apoatã IAC 2258		Única cultivar pertencente à espécie <i>Coffea canephora</i> registrada pelo IAC. Porta-enxerto resistente aos nematoides <i>Meloidogyne exigua</i> , <i>M. paranaensis</i> e a algumas raças de <i>M. incognita</i> . Vigoroso e abundante sistema radicular. Indicada como porta-enxerto para qualquer uma das cultivares de café tipo arábica recomendada.